



Ejecución de la estrategia de restauración riparia y agroforestal a nivel de paisaje y corredores hidro-biológicos en el sistema de humedales Catazajá

Karina González Bocanegra



El Sistema de Humedales de Catazajá, decretado en 2006 como Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) por el Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE) y reconocido como Humedal de Importancia Internacional (Sitio Ramsar) en 2008 por la Convención sobre los Humedales. Tomando como base el Acuerdo de Cabildo de 2004 mediante el cual se reconoce al Ordenamiento Ecológico Territorial como el instrumento de planificación y regulación del municipio.

Localización

Los humedales del noreste de Chiapas, constituyen la porción meridional del mayor complejo de ecosistemas acuáticos de Mesoamérica, que se extiende desde la laguna de Términos y los Pantanos de Centla en la costa del Golfo, hasta la cuenca media del río Usumacinta, en la frontera con Guatemala. El área de estudio se localiza entre los 17° 34'

48" y 18° 06' 00" 48" y 92° 10' 48" los municipios de Catazajá, La Libertad y una parte de Palenque. Colinda al oeste con el municipio de Salto de Agua, y al norte y este con los municipios de Emiliano Zapata y Jonuta, Tabasco.


Fisiográficamente se localiza en la llanura costera del Golfo de México, región económica VI Selva del estado de Chiapas (Romero et al., 2007). Presenta un relieve plano con una altitud de 20 msnm y un clima cálido-húmedo (Af) con precipitaciones anuales de 2,321.8 mm y temperatura promedio de 26.4° C. El área se caracteriza por poseer más de 60 000 has de humedales de tipo palustre, lacustre y riverino, recibiendo el aporte de los ríos Chacamax, San Antonio, Chico y Potrero, y sujeta al régimen de inundación anual del río Usumacinta (IDESMAC, 2004; Rodiles et al., 2002).

Vegetación

La vegetación histórica corresponde a una selva baja perennifolia con planicies sabanas, aunque en la actualidad más del 80% de los ecosistemas nativos han sido impactados por actividades pecuarias (Pennington y Sarukhan, 2005; IDESMAC, 2004). Impulsa el desarrollo de la ganadería y se impone el modelo agrícola de monocultivo basado en maíz y frijol.



Propuesta general de Corredor Biológico para las seis comunidades del sistema lagunar Catazajá - Chiapas, México



Mapa 1: Propuesta general de Corredor Biológico para las seis comunidades del Sistema Lagunar Catazajá

Novedades con iniciativas

- Se han realizado campamentos ecos turísticos de bajo impacto ecológico
- Se ha incorporado a la Red de Viveros del Golfo de México.
- Se encuentra en proceso de vinculación con la UNACH y la UNICACH.

Actividades principales realizadas el mes de Noviembre 2016.

1. Segundo módulo de la comunidad de aprendizaje
2. Visita a casa del Agua, Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla
3. Visita del comité agroecológico a Pej Pem, Amextra.

¡Ven y conoce nuestro proyecto!

Objetivo

- Diseñar e implementar un modelo de gobernanza comunitaria para el fortalecimiento de la restauración ecológica participativa del Sistema de Humedales Catazajá.

Número de hectáreas bajo manejo forestal sustentable: 290.

Comunidades beneficiadas: Agua Fría, Punta Arena, El Desengaño, El Paraíso, Ignacio Zaragoza y El Pajonal.

¿Qué estamos haciendo y que planeamos hacer?

- Fortaleciendo capacidades locales con un diplomado en curso y una escuela de aprendizaje sobre el sistema Lagunar.
- Diseñamos dos prototipos de proyectos productivos para mejora de la economía local y sustentable
- Diseño e implementación de un sistema de gobernanza local
- Se están realizando reuniones de organización de comités comunitarios
- Ordenamiento territorial. Herramienta que nos servirá para reglamentar el territorio sustentablemente.



Foto: Archivo IDESMAC